Indicazioni per i campionamenti dopo uscita provvedimento ZUR del 22/11/2021

MOVIMENTAZIONE POLLAME NELLE ZONE DI RESTRIZIONE (ZUR, ZS, ZP)

1. **Vietato l'accasamento di tutte le specie avicole in ZP e ZS, nell'intera ZUR divieto di accasamento di tacchini da carne derogabile solo da Ministero previo parere del CRN-IA**
2. **Possibile la movimentazione dei volatili esclusivamente in deroga alle seguenti condizioni**:

Specie animale	Visita clinica*	Matrice prelievi **	Tempistica prelievi
Tacchini da carne **Galline ovaiole** **Anatre e oche** **Verso il macello**	Nelle **24 h** precedenti il primo carico: segnalazioni di sintomatologia sospetta, controllo mortalità e parametri produttivi **Da ripetere ogni 24 h da ZP; ogni 48 h da ZS; ogni 48h (ogni 72h nel weekend) in ZUR**	**Da ZP: 60 TT per capannone** **Da ZS e ZUR: 30 TT per capannone fino ad un massimo di 150**	**48 h precedenti primo carico da ZS e ZUR, 24 h precedenti primo carico da ZP^** **Solo per ZS e ZUR per la macellazione di lunedì mattina valgono i prelievi fatti al venerdì precedente**
Altri volatili al macello (polli, faraone, riproduttori, galletti, ecc.) **Verso il macello**	Nelle **24 h** precedenti il primo carico: segnalazioni di sintomatologia sospetta, controllo mortalità e parametri produttivi **Da ripetere ogni 24 h da ZP; ogni 48 h da ZS; ogni 48h (ogni 72h nel weekend) in ZUR**	**Da ZP: 60 TT per capannone** **Da ZS: 30 TT per capannone fino ad un massimo di 150** **Solo per** i **broiler** da ZP: includere oltre ai TT anche 5 carcasse/capannone fino ad un massimo di 20 (o in alternativa teste e colli)	**72 h precedenti primo carico da ZUR, 48 h precedenti primo carico da ZS, 24 h precedenti primo carico da ZP^** **Solo per ZS e ZUR per la macellazione di lunedì mattina valgono i prelievi fatti al venerdì precedente ^**
Animali da vita (pollastre)	Nelle **24 h** precedenti il primo carico: segnalazioni di sintomatologia sospetta, controllo mortalità e dei parametri produttivi	**30 TT per capannone fino ad un massimo di 150**	**48 h precedenti il primo carico** **Da ripetere ogni 48 ore da ZS e 72 h da ZUR**

^ **Il carico degli animali in ZP deve essere concluso in meno di 48 ore**. I carichi che richiedono tempistiche superiori alle 48 ore devono essere autorizzati dall'Autorità competente. In questo caso è necessario prevedere un nuovo il prelievo del set di campioni in accordo con il laboratorio esecutore delle analisi.

* Qualsiasi sospetto clinico deve comportare l'arresto della movimentazione durante tutta la durata del carico e l'esecuzione degli approfondimenti diagnostici del caso.

** I tamponi tracheali (TT) vanno prelevati **obbligatoriamente** sugli animali morti (al massimo il giorno prima e che non siano stati congelati) o morenti, malati, o disvitali. I restanti campioni per arrivare ai 30 o

60 per capannone si effettuano come al solito sugli animali vivi, facendo molta attenzione a fare il prelievo correttamente in trachea e in modo omogeneo all’interno del capannone (avanti, al centro e in coda).

MONITORAGGI NELLE ZONE DI RESTRIZIONE (ZUR e ZP)

Tipo di Zona	Tacchini da carne	Galline Ovaiole	Altre Specie
ZUR	**Sorveglianza Passiva**[1] x tutte le specie		
ZP	**Sorveglianza Attiva** su tacchini > 30 giorni e galline ovaiole mediante tamponi tracheali su 5 morti di recente o su soggetti malati o moribondi per capannone con le seguenti cadenze: - Almeno una volta a settimana negli allevamenti di tacchini; - 1 volta ogni 14 giorni per gli allevamenti di galline ovaiole.		

[1] La sorveglianza nella ZUR è basata sull'immediata segnalazione di qualsiasi variazione anche minima nella produzione, in particolare per quanto riguarda la mortalità, i consumi di mangime e acqua e la deposizione delle uova; sono previsti i campioni standard (TT su tutti i morti presenti fino ad un massimo di 20 per allevamento).

Misure da applicare in zona di sorveglianza (ZS) fuori dalla ZUR

Vietati tutti gli spostamenti

- **In deroga: la Regione** può permettere la movimentazione di **pollame, pollastre, pulcini di un giorno, uova** all'interno della ZS. **I controlli da effettuare verranno stabiliti di volta in volta nelle rispettive deroghe tramite i protocolli standard.**
- Le carcasse possono essere avviate alla distruzione, ma i veicoli destinati al trasporto devono essere puliti e disinfettati senza indugio
- È vietata, salvo autorizzazione del veterinario Ufficiale, la rimozione o lo spargimento della pollina

Per gli altri adempimenti far riferimento al Provvedimento sull'istituzione della nuova ZUR del 22/11/2021 n. 0027237-22/11/2021-DGSAF-MDS-P

Controlli sugli allevamenti della Regione Veneto in Aree A e B, fuori dalle zone di restrizione (ZP, ZS, ZUR)

DESTINATI AL MACELLO

Specie animale	Visita clinica*	Prelievi e tempistiche
Tacchini da carne per macello e ovaiole a fine ciclo	**48 h** precedenti il primo carico	- 20 tamponi tracheali fino ad un massimo di 60 campioni per allevamento - Almeno 5 campioni di sangue per capannone, fino a un massimo di 30 campioni per allevamento Il prelievo deve essere effettuato: i) 48 ore prima del primo carico; nel caso di movimentazione prevista il lunedì, è consentito effettuare il campionamento il venerdì precedente; ii) Il prelievo, limitatamente ai soli tamponi tracheali, va ripetuto ogni 48 ore fino al completamento del carico

* Durante tutta la durata del carico deve essere effettuato il controllo dello stato sanitario degli animali e qualsiasi sospetto clinico deve comportare l'arresto della movimentazione e l'esecuzione degli approfondimenti diagnostici del caso.

Monitoraggi negli allevamenti della regione Veneto in zone non A e non B

Specie animale	Tempistica controlli
Tutte le specie avicole	**Sorveglianza passiva**: La sorveglianza è basata sull'immediata segnalazione di qualsiasi variazione anche minima nella produzione, in particolare per quanto riguarda la mortalità, i consumi di mangime e acqua e la deposizione delle uova; sono previsti i campioni standard (**TT su tutti i morti presenti fino ad un massimo di 20 per allevamento)**.

Quando in allevamento siano necessari trattamenti antibiotici o accertamenti per presenza di patologie, il veterinario aziendale deve esserne informato e, se trattasi di tacchini da carne, ovaiole o svezzatori con animali > 3 settimane, insieme al veterinario ufficiale verrà valutata la necessità di effettuare il prelievo per ricerca IA

Attività di Sorveglianza in Aziende a contatto

Tipo di Zona	Tutte le specie
Ovunque in Regione Veneto	TT su tutti i morti presenti fino ad un massimo di 20 per allevamento preferendo la raccolta di tamponi nei capannoni che presentano la maggiore mortalità nel momento del sospetto. **Frequenza:** 2 volte a settimana